

Calendário de vacinação

SBlm Criança
(0 < 10 anos)



Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBlm) 2020/2021

VACINAS	AO NASCER	1 MÊS	2 MESES	3 MESES	4 MESES	5 MESES	6 MESES	7 MESES	8 MESES	9 MESES	12 MESES	15 MESES	19 MESES	24 MESES	4 ANOS	5 ANOS	6 ANOS	9 ANOS	<10 ANOS	
BCG ID	DOSE ÚNICA																			
HEPATITE B	1ª DOSE		2ª DOSE				3ª DOSE													
TRÍPLICE BACTERIANA (DTPw ou DTPa)			1ª DOSE		2ª DOSE		3ª DOSE					REFORÇO			REFORÇO					
Haemophilus Influenza b			1ª DOSE		2ª DOSE		3ª DOSE					REFORÇO								
Poliomielite (vírus inativados)			1ª DOSE		2ª DOSE		3ª DOSE					REFORÇO			REFORÇO					
Rotavírus			DUAS OU TRÊS DOSES, DEPENDENDO DA VACINA UTILIZADA																	
Pneumocócicas Conjugadas			DUAS OU TRÊS DOSES, DEPENDENDO DA VACINA UTILIZADA									REFORÇO								
Meningocócicas Conjugadas (ACWY)				1ª DOSE		2ª DOSE						REFORÇO					REFORÇO			
Meningocócica B				1ª DOSE		2ª DOSE						REFORÇO								
Influenza (gripe)								DOSE ANUAL DUAS DOSES NA PRIMOVACINAÇÃO ANTES DOS 9 ANOS DE IDADE												
Poliomielite Oral (vírus vivos atenuados)											DIAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO									
Febre Amarela										1ª DOSE								2ª DOSE		
Hepatite A												1ª DOSE		2ª DOSE						
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola)												1ª DOSE	2ª DOSE							
Varicela (catapora)												1ª DOSE	2ª DOSE							
HPV																			DUAS DOSES	
Vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto																			REFORÇO	
Dengue																			TRÊS DOSES PARA SOROPositivos	

Algumas vacinas podem estar especialmente recomendadas para pacientes portadores de comorbidades ou em outra situação especial. Consulte os Calendários de Vacinação SBlm pacientes especiais.

06/06/2020 Sempre que possível, preferir vacinas combinadas. Sempre que possível considerar aplicações simultâneas na mesma visita. Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente. Eventos adversos significativos devem ser notificados às autoridades competentes.